

Rappels et compléments sur les fonctions

1	Vocabulaire usuel	2
1.1	Domaine de définition	2
1.2	Graphe d'une fonction, image, antécédent	3
1.3	Opérations sur les fonctions	4
1.4	Fonctions monotones	5
1.5	Majorant, minorant, extremum	6
1.6	Fonctions paires, impaires, périodiques	7
2	Fonctions continues, fonctions dérivables	8
2.1	Limites de fonctions	8
2.2	Continuité	9
2.3	Rappels sur la dérivée	10
2.4	Dérivées et opérations	12
2.5	Dérivée et monotonie	13
2.6	Dérivées d'ordre supérieur	13
3	Tracé du graphe d'une fonction	14
3.1	Transformations affines	14
3.2	Réduction du domaine d'étude	15
3.3	Asymptotes	15
4	Introduction à la notion de bijection	16
4.1	Définition, premières propriétés	16
4.2	Graphe de la bijection réciproque	17
4.3	Le théorème de la bijection	18
4.4	Dérivabilité de la bijection réciproque	19

Compétences attendues.

- ✓ Identifier et exploiter les symétries d'une courbe représentative de fonction.
- ✓ Étudier les variations d'une fonction et en tracer la courbe représentative (domaine de définition, calcul de la dérivée, tableau de variations, limites aux bornes du domaine, asymptotes éventuelles).
- ✓ Montrer qu'une fonction est majorée, minorée, bornée, et déterminer ses extremums éventuels.
- ✓ Appliquer le théorème de la bijection pour montrer l'existence et l'unicité d'une solution d'une équation.

1 Vocabulaire usuel

1.1 Domaine de définition

Définition.

Soit X une partie de \mathbb{R} .

Une *fonction f de X dans \mathbb{R}* est un objet mathématique associant à tout élément $x \in X$:

- un et un seul élément $y = f(x) \in \mathbb{R}$ lorsque l'expression $f(x)$ a bien un sens ;
- aucun élément dans le cas contraire.

On appelle *domaine de définition de f* , et on note \mathcal{D}_f , l'ensemble des valeurs de la variable x pour lesquelles l'expression $f(x)$ a bien un sens.

On dit que *f est définie sur une partie \mathcal{D} de \mathbb{R}* si $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}_f$.

Rédaction.

Lors de l'étude d'une fonction f , on commencera par bien préciser le domaine de définition de f (si cela n'est pas déjà fait dans l'énoncé).

Exercice 1. Déterminer le domaine de définition des fonctions f et g définies par :

$$f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 6} \text{ et } g(x) = \frac{1}{\cos(2x)}.$$

Notation.

Si f est définie sur \mathcal{D} , on note alors : $f : \begin{cases} \mathcal{D} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \end{cases}$.

Deux remarques sur cette notation :

- on observera bien la différence subtile entre les deux flèches : la première, sans barre verticale, signifie que f est définie sur \mathcal{D} et à valeurs dans \mathbb{R} . La seconde flèche, avec une barre verticale, signifie que f associe le réel $f(x)$ au réel x .

S'il n'y a pas d'ambiguïté sur le domaine de définition, on note parfois simplement $f : x \mapsto f(x)$.

- la variable x est une variable muette, et on peut changer son nom à loisir : les notations $x \mapsto x^2$, $t \mapsto t^2$ et $u \mapsto u^2$ désignent la même fonction.



Mise en garde.

On veillera à ne pas confondre la **fonction** f et le **nombre** $f(x)$. Par exemple si f est la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2$, alors on peut dire « f est dérivable », mais pas « $f(x)$ est dérivable », la notion de dérivabilité n'ayant de sens que pour les fonctions.

Dans le même esprit, on n'écrira pas « la fonction $x \mapsto x^3$ est croissante pour tout $x \in \mathbb{R}$ », mais « la fonction $x \mapsto x^3$ est croissante sur \mathbb{R} », l'affirmation « la fonction $x \mapsto x^3$ est croissante » étant indépendante de la variable x (elle peut en effet aussi bien s'écrire « la fonction $t \mapsto t^3$ est croissante »).

Définition.

Soit f une fonction définie sur \mathcal{D} , et soient A et B des parties de \mathbb{R} telles que $A \subset \mathcal{D} \subset B$.

- On appelle *restriction de f à A* , notée $f|_A$, la fonction définie sur A **seulement** par la relation $f|_A(x) = f(x)$ pour tout $x \in A$.
- On appelle *prolongement de f à B* toute fonction g définie sur B pour laquelle $g|_{\mathcal{D}} = f$, c'est-à-dire pour laquelle $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$.




Mise en garde.

Toute fonction (qui n'est pas définie sur \mathbb{R}) possède beaucoup de prolongements.

Par exemple, si f est la fonction définie sur $[0, 1[$ par $f(x) = x$, alors $g : x \mapsto |x|$ et $h : x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ sont des prolongements de f à \mathbb{R} .

On parle donc toujours d'**un** prolongement, et non **du** prolongement.



Deux prolongements de $f : x \in [0, 1[\mapsto x$.

1.2 Graphe d'une fonction, image, antécédent

Définition.

Si f est une fonction définie sur \mathcal{D} , le *graphe de f* ou *courbe représentative de f* est l'ensemble noté \mathcal{C}_f des points du plan de coordonnées (x, y) où $x \in \mathcal{D}$ et $y = f(x)$.

Définition.

Soit $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie \mathcal{D} de \mathbb{R} .

- Si x appartient à \mathcal{D} , on dit que $f(x)$ est l'*image de x par f* ;
- Si $x \in \mathcal{D}$ et $y \in \mathbb{R}$ sont tels que $y = f(x)$, on dit que x est **un antécédent de y par f** .

Exemple. Si f est la fonction cosinus, alors $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, de sorte que $\frac{1}{2}$ est l'image de $\frac{\pi}{3}$ par f , ou encore $\frac{\pi}{3}$ est un antécédent de $\frac{1}{2}$ par f . Mais puisque $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $-\frac{\pi}{3}$ est aussi un antécédent de $\frac{1}{2}$ par f .




Mise en garde.

Un élément x de \mathcal{D} possède toujours une et une seule image par f . En revanche, un réel y peut posséder plusieurs antécédents par f , ou aucun.

Par exemple pour la fonction f représentée ci-contre, y_1 n'a pas d'antécédent par f , y_2 en possède deux, y_3 en a un unique.

On prendra donc bien garde de parler d'un antécédent de y par f , et non de « l' » antécédent de y par f .



Définition.

Soit $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie \mathcal{D} de \mathbb{R} .

Pour toute partie A de \mathcal{D} , on appelle *image de A par f* , et on note $f(A)$, l'ensemble :

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in A, y = f(x)\} = \{f(a), a \in A\}.$$

L'image $f(\mathcal{D})$ de \mathcal{D} par f est appelée *l'image de f* , et notée $\text{Im}(f)$.

On dit que f est à valeur dans un ensemble B si $\text{Im}(f) \subset B$, autrement dit si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(x) \in B$. On peut alors noter $f : \mathcal{D} \rightarrow B$ au lieu de $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$.

Exemples.

- L'image de \mathbb{R}_+ par la fonction exponentielle est l'intervalle $[1, +\infty[$. L'image de \mathbb{R}_- par l'exponentielle est $]0, 1]$. L'exponentielle est à valeurs dans \mathbb{R}_+ (ou dans \mathbb{R}_+^*), et son image est \mathbb{R}_+^* .
- L'image de $\pi\mathbb{Z}$ par la fonction sinus est $\{0\}$, l'image de $[0, \pi]$ est $[0, 1]$. L'image de la fonction sinus est $[-1, 1]$.

1.3 Opérations sur les fonctions**Définition.**

On dit que deux fonctions f et g sont égales, et on note $f = g$, si :

- elles sont définies sur le même ensemble \mathcal{D} ;
- elles prennent la même valeur en tout point de \mathcal{D} : $\forall x \in \mathcal{D}, f(x) = g(x)$.

Exemple. Les fonctions $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & |x| \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (\sqrt{x})^2 \end{cases}$ coïncident bien sur \mathbb{R}_+ , mais ne sont pas égales car n'ont pas le même ensemble de définition. On a tout de même $f|_{\mathbb{R}_+} = g$.

En revanche, si $h : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sqrt{x^2} \end{cases}$, alors $f = h$.

Définition.

Soient f et g deux fonctions définies sur le **même** ensemble \mathcal{D} .

- La *somme de f et g* est la fonction notée $(f + g)$ définie pour tout $x \in \mathcal{D}$ par :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

- Le *produit de f et g* est la fonction notée $f \times g$ définie pour tout $x \in \mathcal{D}$ par :

$$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x).$$

- Si de plus g ne s'annule pas sur \mathcal{D} , on définit le *quotient de f par g* , et on note $\frac{f}{g}$, la fonction définie pour tout $x \in \mathcal{D}$ par :

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$


Définition.

Soient f une fonction définie sur \mathcal{D} , à valeurs dans A , et g une fonction définie sur A .

On appelle *composée de f suivie de g* la fonction notée $g \circ f$ définie pour tout $x \in \mathcal{D}$ par :

$$g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Remarque. On pourra faire le schéma suivant pour nous aider :



**Danger.**

La composition **n'est pas commutative** : en général, $f \circ g \neq g \circ f$. Par exemple, si $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin(x) \end{cases}$
 et $g : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x + 2\pi \end{cases}$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(g \circ f)(x) = g(\sin(x)) = \sin(x) + 2\pi \neq \sin(x) = \sin(x + 2\pi) = \sin(g(x)) = (f \circ g)(x).$$

On veillera donc bien à l'ordre dans lequel on applique les fonctions : la fonction la plus à droite est celle que l'on applique en premier à la variable.

Propriété 1 (Associativité de la composition)

Soient $f : \mathcal{D} \rightarrow A$, $g : A \rightarrow B$ et $h : B \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions.

Alors $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$, qu'on notera simplement $h \circ g \circ f$.

1.4 Fonctions monotones**Définition.**

Soit f une fonction définie sur un ensemble \mathcal{D} .

- f est *croissante sur \mathcal{D}* (resp. *strictement croissante sur \mathcal{D}*) si pour tous $x, y \in \mathcal{D}$ tels que $x \leq y$ (resp. $x < y$), $f(x) \leq f(y)$ (resp. $f(x) < f(y)$).
- f est *décroissante sur \mathcal{D}* (resp. *strictement décroissante sur \mathcal{D}*) si pour tous $x, y \in \mathcal{D}$ tels que $x \leq y$ (resp. $x < y$), $f(x) \geq f(y)$ (resp. $f(x) > f(y)$).
- f est *monotone* (resp. *strictement monotone*) sur \mathcal{D} si f est soit croissante (resp. strictement croissante), soit décroissante (resp. strictement décroissante) sur \mathcal{D} .

**Danger.**

Pour une fonction f définie sur \mathbb{R} , l'affirmation « $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq f(x+1)$ » **n'est pas** équivalente à « f est croissante ». On pourra s'en convaincre en considérant la fonction $f : x \mapsto \cos(2\pi x)$ qui n'est pas croissante sur \mathbb{R} , mais satisfait pourtant la première assertion.

Remarques.

- Une fonction peut être ni croissante, ni décroissante. Par exemple, la fonction cosinus n'est ni croissante, ni décroissante sur \mathbb{R} . Mais elle est décroissante sur $[0, \pi]$ et croissante sur $[\pi, 2\pi]$.
- Une fonction peut être à la fois croissante et décroissante sur \mathcal{D} , mais c'est le cas si, et seulement si, elle est constante.
- La fonction f définie sur \mathbb{R}^* par $f(x) = \frac{1}{x}$ est décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, mais elle n'est pas décroissante sur \mathbb{R}^* car par exemple $-1 < 1$ et $f(-1) < f(1)$.

Propriété 2

Soient $f : \mathcal{D} \rightarrow A$ et $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions monotones sur leurs ensembles de définition. Alors $g \circ f$ est aussi monotone, et la règle des signes donne le sens de monotonie :

- croissante si f et g ont même sens de variation ;
- décroissante si f et g ont des sens de variation opposés.

Si de plus f et g sont strictement monotones, alors $g \circ f$ est également strictement monotone.

 **Méthode. Sens de variation sans dériver.**

Le résultat ci-dessus peut épargner un calcul de dérivée si notre seul but est de déterminer le sens de variation d'une fonction.

Exercice 2. Déterminer le sens de variation de la fonction $f : \begin{cases}]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^3+1}} \end{cases}$.


1.5 Majorant, minorant, extremum

Définition.

Soit f une fonction définie sur \mathcal{D} . On dit que f est :

- *majorée* s'il existe un réel M tel que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(x) \leq M$. Un tel réel M , s'il existe, est alors appelé un *majorant* de f .
- *minorée* s'il existe un réel m tel que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(x) \geq m$. Un tel réel m , s'il existe, est alors appelé un *minorant* de f .
- *bornée* lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Exemples.



Remarque. f est majorée (resp. minorée, bornée) si, et seulement si, $\text{Im}(f)$ est une partie majorée (resp. minorée, bornée) de \mathbb{R} .

Propriété 3 (Caractérisation d'une fonction bornée)

Une fonction $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée si, et seulement si, il existe $K \in \mathbb{R}_+$ tel que :

$$\forall x \in \mathcal{D}, \quad |f(x)| \leq K.$$

Définition.

Soit f une fonction définie sur \mathcal{D} , et soit $a \in \mathcal{D}$. On dit que f possède :

- un *maximum en a* si : $\forall x \in \mathcal{D}, f(x) \leq f(a)$.
Le réel $f(a)$ est alors appelé **le** maximum de f , et on note alors $f(a) = \max_{x \in \mathcal{D}} f(x)$.
- un *minimum en a* si : $\forall x \in \mathcal{D}, f(x) \geq f(a)$.
Le réel $f(a)$ est alors appelé **le** minimum de f , et on note alors $f(a) = \min_{x \in \mathcal{D}} f(x)$.
- un *extremum en a* si f possède soit un maximum, soit un minimum en a .


Remarque. Si f possède un maximum en a , alors elle est majorée, et $f(a)$ est un majorant de f .



Mise en garde.

Une fonction peut très bien ne pas avoir de maximum ni de minimum. Et quand elle en a un, il peut être atteint plusieurs fois.

Par exemple, la fonction f représentée ci-contre admet un minimum, atteint en deux points a et b . Elle n'a cependant pas de maximum.



Exemples.

- La fonction exponentielle $f : x \in \mathbb{R} \mapsto e^x$ n'est pas majorée car elle tend vers $+\infty$ en $+\infty$. Elle n'admet donc pas de maximum sur \mathbb{R} . Elle est minorée (par 0), mais n'admet pas de minimum sur \mathbb{R} puisque pour tout $a \in \mathbb{R}$, $f(a/2) < f(a)$ par stricte décroissance.
- La fonction sin possède un maximum qui vaut 1, atteint en tous réels de la forme $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

1.6 Fonctions paires, impaires, périodiques

Définition.

Soit f une fonction définie sur un ensemble \mathcal{D} symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire tel que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $-x \in \mathcal{D}$). On dit que f est :

- *paire* si : $\forall x \in \mathcal{D}, f(-x) = f(x)$;
- *impaire* si : $\forall x \in \mathcal{D}, f(-x) = -f(x)$.

Exemples.

- Les fonctions $x \mapsto x^2$, $x \mapsto |x|$ et $x \mapsto \cos(x)$ sont paires.
- Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto x$, $x \mapsto x^3$ sont impaires, de même que $x \mapsto \sin(x)$ et $x \mapsto \tan(x)$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^n$ est de même parité que n .

Remarque. Si f est impaire et si $0 \in \mathcal{D}$, alors :

$$f(0) = f(-0) = -f(0), \text{ d'où } f(0) = 0.$$

Ainsi sa courbe \mathcal{C}_f contient toujours le point $(0, 0)$.

Définition.

Soit f une fonction définie sur une partie \mathcal{D} de \mathbb{R} .

- Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$. On dit que f est *périodique de période T*, ou *T-périodique*, si :
 - $\forall x \in \mathcal{D}, x + T \in \mathcal{D}$ et $x - T \in \mathcal{D}$;
 - $\forall x \in \mathcal{D}, f(x + T) = f(x)$.
- f est dite *périodique* s'il existe un réel $T > 0$ tel que f soit T -périodique.

Exemples.

- Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques.
- Pour tout $a > 0$, la fonction $x \mapsto \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$ est a -périodique.
- La fonction $x \mapsto x - [x]$ est 1-périodique. En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $[x + 1] = [x] + 1$, et donc :

$$f(x + 1) = (x + 1) - [x + 1] = x + 1 - ([x] + 1) = x - [x] = f(x).$$

Remarque. Si $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ est T -périodique, alors pour tout $x \in \mathcal{D}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $f(x + kT) = f(x)$. Ainsi pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, f est aussi (kT) -périodique.

2 Fonctions continues, fonctions dérivables

2.1 Limites de fonctions

La définition précise de limites et de la continuité fera l'objet d'un chapitre ultérieur, nous nous contentons donc de l'intuition de limite, et des propriétés déjà connues.

Propriété 4 (Opérations sur les limites)

Soient f et g des fonctions définies sur un intervalle I . Soient $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ et a un élément ou une borne de I (éventuellement $\pm\infty$).

- **Somme.**

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
Alors $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

- **Produit.**

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$\ell > 0$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$\ell < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
Alors $\lim_{x \rightarrow a} (f \times g)(x) =$	$\ell \times \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

- **Quotient.** Si $\ell' \neq 0$:

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$+\infty$ ou $-\infty$	$\ell' > 0$	$\ell' > 0$	$\ell' < 0$	$\ell' < 0$	$+\infty$ ou $-\infty$
Alors $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

Et dans le cas où ℓ' est nul :

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	$\ell > 0$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$\ell < 0$	0
Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	0^+	0^-	0^+	0^-	0
alors $\frac{f}{g}$ a pour limite	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.



Astuce.

Si on obtient aucune forme indéterminée

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0},$$

on peut calculer directement la limite de la fonction à l'aide des opérations sur les limites.

Sinon, on transforme l'expression algébrique donnée (en développant, en factorisant, en multipliant par la quantité conjuguée, ...) pour lever l'indétermination.

Exercice 3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - \frac{1}{x}}{1 - x^4}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2 - \sqrt{4 - \frac{1}{x}}}$.

Propriété 5 (Limite d'une fonction composée)

Soient $a, b, c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et f, g deux fonctions telles que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$.

Alors, sous réserve d'existence, la fonction composée $g \circ f$ vérifie :

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c.$$

Remarque. Cette dernière propriété justifie la recherche d'une limite par changement de variable : on ne s'intéresse plus à la limite de $g \circ f(x)$ quand $x \rightarrow a$, mais de $g(X)$ quand $X \rightarrow b$.

Exercice 4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2(x) + 2 \ln(x)}{\ln^2(x) + 1}$.

Propriété 6

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un élément ou une borne de l'intervalle I tels que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Pour toute suite (u_n) d'éléments de I satisfaisant $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = b$.

Exercice 5. Montrer que la fonction cosinus n'admet pas de limite en $+\infty$.

2.2 Continuité

Définition.


Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que :

- f est *continue* en un point $a \in I$ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$;
- f est *continue sur un intervalle* I si elle est continue en tout point de I .

Exercice 6. Justifier que la fonction *partie entière* $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \lfloor x \rfloor$ est discontinue en tout $k \in \mathbb{Z}$.

Interprétation graphique. Une fonction f est continue sur un intervalle I si elle est définie sur cet intervalle et si sa courbe représentative se trace d'un « trait continu », sans lever le crayon.

On constate bien par exemple que la fonction *partie entière* est discontinue en tout $k \in \mathbb{Z}$ en observant sa courbe représentative :



Courbe représentative de la fonction partie entière.

Propriété 7 (Prolongement par continuité)

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a, b]$ (ou $]a, b[$, ou $]a, +\infty[$).

On dit que f est *prolongeable par continuité en a* si f admet une limite **finie** ℓ en a .

On appelle alors prolongement par continuité de f en a la fonction \tilde{f} définie sur $[a, b]$ (ou $[a, b[$, ou $[a, +\infty[$) par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \ell & \text{si } x = a \\ f(x) & \text{sinon} \end{cases}.$$

La fonction ainsi prolongée est alors nécessairement continue en a .

**Danger.**

On ne parlera de prolongement par continuité qu'en un réel, pas en $\pm\infty$. En effet, $-\infty$ et $+\infty$ n'étant pas des réels, il n'est pas question d'écrire $f(+\infty)$ ou $f(-\infty)$.


Exemple. La fonction *sinus cardinal*.

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R}_+ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$. f est continue sur \mathbb{R}_+ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. De plus :

$$f(x) = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \sin'(0) = \cos(0) = 1.$$

Donc f est prolongeable par continuité en une fonction \tilde{f} continue sur \mathbb{R}_+ (appelée fonction *sinus cardinal*) en posant :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\sin(x)}{x} & \text{sinon} \end{cases}.$$



Courbe représentative de f et de son prolongement par continuité \tilde{f} en 0.

2.3 Rappels sur la dérivée**Définition.**

Soit $a \in I$. On appelle *taux d'accroissement de f en a* la fonction


$$\tau_a(f) : \begin{cases} I \setminus \{a\} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{cases}.$$

On dit que f est *dérivable en a* si $\tau_a(f)$ admet une limite finie quand x tend vers a . Dans ce cas, la limite est appelée *nombre dérivé de f en a* et est noté $f'(a)$. Ainsi, sous réserve d'existence :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si f est dérivable en tout point de I , on dit que f est *dérivable sur I* , et on appelle *fonction dérivée de f* la fonction $f' : x \mapsto f'(x)$.


Interprétation géométrique. Fixons $a \in I$ et considérons $m \in I, m \neq a$. On note $A(a, f(a))$ et $M(m, f(m))$ un point distinct de A appartenant à la courbe représentative de f .



Rappelons que la droite (ou corde) (AM) a pour équation cartésienne :

$$y = \frac{f(m) - f(a)}{m - a}(x - a) + f(a).$$

Par définition, f est dérivable en a si, et seulement si, le coefficient directeur de la corde (AM) admet une limite finie quand m tend vers a .




Dans ce cas, la position limite de la droite (AM) lorsque M tend vers A est la *tangente* à \mathcal{C}_f au point A . Son coefficient directeur est donc $f'(a)$, et son équation cartésienne est :

$$\boxed{y = f'(a)(x - a) + f(a).}$$

Exercice 7. Justifier que la fonction *valeur absolue* $f : x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0.

Remarque. La courbe représentative de la fonction *valeur absolue* présente en 0 un point anguleux, et donc n'y admet pas de tangente.



Courbe représentative de la fonction valeur absolue.

Propriété 8 (La dérivabilité implique la continuité)

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

**Danger.**

La réciproque est fautive : une fonction peut être continue en un point et non dérivable en ce point. Par exemple, la fonction *valeur absolue* est continue en 0 et non dérivable en 0.

2.4 Dérivées et opérations

Propriété 9 (Opérations sur les fonctions dérivables)

Soient f, g deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I , $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- La combinaison linéaire $\lambda f + \mu g$ est encore dérivable sur I , et pour tout $x \in I$:

$$(\lambda f + \mu g)'(x) = \lambda f'(x) + \mu g'(x).$$

- Le produit $f \times g$ est encore dérivable sur I , et pour tout $x \in I$:

$$(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

- Si g ne s'annule pas sur I , le quotient $\frac{1}{g}$ est dérivable sur I , et pour tout $x \in I$:

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = -\frac{g'(x)}{(g(x))^2}.$$

- Si g ne s'annule pas sur I , le quotient $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Propriété 10 (Composée de fonctions dérivables)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I à valeurs dans un intervalle J , et soit g une fonction dérivable sur J . Alors la fonction $g \circ f$ est dérivable sur I , et pour tout $x \in I$:

$$(g \circ f)'(x) = f'(x) \times g'(f(x)).$$

Corollaire 11

Soit u une fonction dérivable sur I .

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction u^n est dérivable sur I , et pour tout $x \in I$:

$$(u^n)'(x) = nu'(x)u(x)^{n-1}.$$

Ceci est encore valable si $n < 0$ à condition que u ne s'annule pas sur I .

- La fonction e^u est dérivable sur I , et $(e^u)'(x) = u'(x)e^{u(x)}$.
- Si u ne s'annule pas sur I , $\ln(|u|)$ est dérivable, et pour tout $x \in I$, $(\ln(|u|))'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Exercice 8. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{(\ln(x^2 + 2))^4}$ est dérivable sur \mathbb{R} et calculer sa dérivée.

2.5 Dérivée et monotonie

Propriété 12

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

f est croissante (resp. décroissante) sur I si, et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$ (resp. $f'(x) \leq 0$).



Mise en garde.

Il est indispensable que I soit un **intervalle**.

Par exemple, la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur \mathbb{R}^* , et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \leq 0$.

Pourtant, f n'est pas décroissante sur \mathbb{R}^* . Le problème vient évidemment du fait que \mathbb{R}^* n'est pas un intervalle. En revanche, \mathbb{R}_+^* et \mathbb{R}_-^* sont des intervalles sur lesquels f est décroissante puisque sa dérivée y est négative.

Corollaire 13

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors f est constante sur I si, et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$.

Propriété 14

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Si f' est positive (respectivement négative) sur I et ne s'annule qu'un nombre fini de fois sur I , alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I .

Remarque. En particulier, si f' est strictement positive (resp. strictement négative) sur I , alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I .

Exemple. Soit $f : x \mapsto x^3$. Alors f est dérivable sur \mathbb{R} et $f'(x) = 3x^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc f' est positive sur \mathbb{R} , et ne s'annule qu'en 0. Donc f est strictement croissante sur \mathbb{R} .

Exercice 9. Montrer que la fonction $g : x \mapsto x + \cos(x)$ est strictement croissante sur \mathbb{R} .

2.6 Dérivées d'ordre supérieur

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I . On définit récursivement les dérivées successives de f par :

- $f^{(0)} = f$;
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $f^{(n)}$ est dérivable sur I , $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Si pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f^{(n)}$ existe, on dit que f est n fois dérivable sur I , et on appelle $f^{(n)}$ la dérivée n -ième de f sur I .

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I et $n \in \mathbb{N}$. On dit que :

- f est de classe \mathcal{C}^n sur I si f est n fois dérivable sur I , et $f^{(n)}$ est continue sur I .
- f est de classe \mathcal{C}^∞ sur I si f est \mathcal{C}^k sur I pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$) l'ensemble des fonctions de I dans \mathbb{R} de classe \mathcal{C}^n (resp. \mathcal{C}^∞).

Remarques.

- $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, qu'on pourra noter plus simplement $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, est l'ensemble des fonctions continues sur I , $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions dérivables sur I et dont la dérivée est continue sur I , $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables sur I .
- Les théorèmes opératoires sur les fonctions dérivables s'étendent au cas des fonctions k fois dérivables ou indéfiniment dérivables.
- On dispose de la suite d'inclusions : $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) \subset \dots \subset \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Exercice 10. Soit f la fonction définie sur \mathbb{R}_+^* par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Montrer que f est indéfiniment dérivable, et que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$.

3 Tracé du graphe d'une fonction

Dans cette partie, on considère une fonction $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ et on note \mathcal{C}_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) du plan.

3.1 Transformations affines du graphe d'une fonction


Propriété 15

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$.

• Symétries :

Le graphe de la fonction $x \mapsto -f(x)$ s'obtient à partir de celui de f par une symétrie par rapport à (Ox) .


Le graphe de la fonction $x \mapsto f(-x)$ s'obtient à partir de celui de f par une symétrie par rapport à (Oy) .



• Translations :

Le graphe de la fonction $x \mapsto f(x) + b$ s'obtient à partir de celui de f par une translation de vecteur $b\vec{j}$.


Le graphe de la fonction $x \mapsto f(x + a)$ s'obtient à partir de celui de f par une translation de vecteur $-a\vec{i}$.



• Dilatations :

Le graphe de la fonction $x \mapsto \lambda f(x)$ s'obtient à partir de celui de f par une dilatation verticale de rapport λ .

Le graphe de la fonction $x \mapsto f(\lambda x)$ s'obtient à partir de celui de f par une dilatation horizontale de rapport $\frac{1}{\lambda}$.



Corollaire 16

- Si f est T -périodique, \mathcal{C}_f est invariant par translation de vecteur $T \vec{i}$.
- Si f est paire, \mathcal{C}_f est symétrique par rapport à l'axe (Oy) .
- Si f est impaire, \mathcal{C}_f est symétrique par rapport à l'origine.

3.2 Réduction du domaine d'étude**Méthode. Réduction du domaine d'étude.**

Avant d'étudier une fonction $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$, on essaie de réduire autant que faire se peut le domaine sur lequel on l'étudie, en se ramenant à un intervalle plus petit puis en utilisant les éventuelles symétries que peut présenter \mathcal{C}_f .

- Si f est paire ou impaire, on restreint son étude au domaine $\mathcal{D} \cap [0, +\infty[$, et on complète la courbe par une symétrie (axiale ou centrale).
- Si f est T -périodique, on restreint son étude à un intervalle de longueur T , et on complète la courbe par translation de vecteur $T \vec{i}$.

Exercice 11. Déterminer le domaine d'étude de la fonction $f : x \mapsto \frac{\cos(2x)}{\cos^2(x) + 1}$.

3.3 Asymptotes**Définition.**

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]c, +\infty[$ (resp. $]-\infty, c[$).

La droite D d'équation $y = ax + b$ est *asymptote* à \mathcal{C}_f au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (ax + b) = 0 \quad (\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (ax + b) = 0).$$

Si $a = 0$, on dit que D est une *asymptote horizontale* à \mathcal{C}_f , sinon on parlera d'*asymptote oblique*.

Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$, on dit que la droite $x = c$ est une *asymptote verticale* à \mathcal{C}_f .

Remarques.

- Une asymptote à \mathcal{C}_f au voisinage de $\pm\infty$ est une droite qui « ressemble au voisinage de l'infini » à \mathcal{C}_f .
- La fonction f possède la droite horizontale d'équation $y = b$ comme asymptote en $+\infty$ si, et seulement si, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$.


Exemple. Soit f la fonction définie par :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 3x - 2 + \frac{2}{x^2} \end{cases}.$$

La droite D d'équation $y = 3x - 2$ est asymptote à \mathcal{C}_f au voisinage de $\pm\infty$ car :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (3x - 2) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x^2} = 0.$$

D'autre part, puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, sa courbe \mathcal{C}_f admet une asymptote verticale en 0.



Propriété 17

La droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à \mathcal{C}_f au voisinage de $\pm\infty$ si, et seulement si :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \end{cases} .$$

Remarque. Par unicité de la limite, les formules ci-dessus prouvent qu'une asymptote, si elle existe, est unique.

Exercice 12. Déterminer les asymptotes éventuelles aux courbes des fonctions suivantes :

$$\bullet f : \begin{cases}]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3x^4 - 5x^3 + 3}{x^3 - 1} \end{cases} ; \quad \bullet g : \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 2x + \ln(x) \end{cases} .$$

4 Introduction à la notion de bijection

4.1 Définition, premières propriétés

Définition.

Soient I et J deux parties de \mathbb{R} , et $f : I \rightarrow J$.

On dit que f réalise une *bijection de I sur J* si tout élément de J admet un unique antécédent par f . Autrement dit, pour tout $y \in J$, il existe un unique $x \in I$ tel que $y = f(x)$.


On appelle alors *bijection réciproque* la fonction notée f^{-1} définie par :

$$f^{-1} : \begin{cases} J \longrightarrow I \\ y \longmapsto f^{-1}(y) = \text{l'unique antécédant de } y \text{ par } f \end{cases} .$$

Ainsi :

$$\begin{cases} y = f(x) \\ x \in I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f^{-1}(y) = x \\ y \in J \end{cases} .$$

Interprétation graphique. f est une bijection de I sur J si, et seulement si, toute droite horizontale d'ordonnée dans J rencontre une et une seule fois \mathcal{C}_f .



Deux bijections de $[a, b]$ sur $[c, d]$.

Exercice 13. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto ax + b \end{cases}$ une fonction affine avec $a \neq 0$.

Montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque.

Exercice 14. Soit g la fonction définie par $g : \begin{cases}]-1, +\infty[& \rightarrow &]-\infty, 1[\\ x & \mapsto & \frac{x-1}{x+1} \end{cases}$.

Montrer que g est une bijection et déterminer sa bijection réciproque.

Définition.

Soit I une partie de \mathbb{R} . On appelle *fonction identité sur I* , et on note id_I , la fonction définie sur I par

$$\text{id}_I : \begin{matrix} I & \rightarrow & I \\ x & \mapsto & x \end{matrix} .$$

Autrement dit, pour tout $x \in I$, $\text{id}_I(x) = x$.

Propriété 18

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection.

- $f^{-1} \circ f = \text{id}_I$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_J$.
- f^{-1} réalise une bijection de J sur I , et $(f^{-1})^{-1} = f$.

Remarque. Si $f : I \rightarrow J$ est une bijection, et si $a, b \in I$, on a l'équivalence :

$$a = b \quad \Leftrightarrow \quad f(a) = f(b).$$

L'implication directe est toujours vraie, que f soit bijective ou non. Pour la réciproque, si f est bijective et si $f(a) = f(b)$, on obtient en appliquant f^{-1} aux deux membres de l'égalité :

$$f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(f(b)), \text{ soit } a = b.$$

Ce résultat est particulièrement utile lorsqu'on résout une équation en procédant par équivalence.

Propriété 19

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection.

- Si f est monotone, alors elle est strictement monotone.
- Si f est monotone, alors f^{-1} est également monotone, de même monotonie que f .

4.2 Graphe de la bijection réciproque

Propriété 20

Si f est une bijection de I sur J , alors le graphe de f^{-1} est obtenu à partir de celui de f via la symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$ (cette droite est généralement appelée la *première bissectrice*).


Exemple. Les courbes représentatives de

$$g : \begin{cases}]-1, +\infty[& \rightarrow &]-\infty, 1[\\ x & \mapsto & \frac{x-1}{x+1} \end{cases}$$

et de

$$g^{-1} : \begin{cases}]-\infty, 1[& \rightarrow &]-1, +\infty[\\ y & \mapsto & \frac{1+y}{1-y} \end{cases}$$

sont symétriques par rapport à la première bissectrice du plan.



Courbes représentatives de g et de g^{-1} .

4.3 Le théorème de la bijection, alias le TVI strictement monotone

Théorème 21 (de la bijection)

Soit f est une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I de \mathbb{R} . Alors :

- $J = f(I)$ est un intervalle, et f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$;
- son application réciproque f^{-1} est elle-même **continue** sur J , **strictement monotone** et de **même sens de variation** que f .

Corollaire 22

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I . Pour tout $c \in J = f(I)$, l'équation $f(x) = c$ possède une unique solution.

Méthode. Comment montrer qu'une fonction est bijective ?

Soit f une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans un intervalle J . Pour montrer que f réalise une bijection de I sur J , on pourra utiliser l'une des méthodes suivantes.

- **Méthode 1 : par le théorème de la bijection.**

On montre que f est **continue** et **strictement monotone** sur I et que $J = f(I)$. Par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de l'intervalle I sur J .

Cette méthode ne donne cependant pas l'expression de la bijection réciproque f^{-1} de f .


- **Méthode 2 : par résolution de l'équation $y = f(x)$.**

On montre que pour tout $y \in J$, l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x \in I$ possède une unique solution qui est $x = f^{-1}(y)$.

Cette méthode n'aboutit pas toujours (il n'est pas toujours possible d'expliciter une solution de l'équation $y = f(x)$). Mais si c'est le cas, elle fournit l'expression de f^{-1} .

Exemple. La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^2 \end{cases}$ est continue et strictement croissante sur \mathbb{R}_+ , à valeurs dans l'intervalle $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$. Par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de \mathbb{R}_+ sur \mathbb{R}_+ .

On appelle sa bijection réciproque la fonction *racine carrée*, notée $f^{-1} : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \sqrt{x}$. Toujours par le théorème de la bijection, f^{-1} est continue et strictement croissante sur \mathbb{R}_+ .



Courbes représentatives des fonctions carrée et racine carrée, symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Exercice 15. Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 + x + 1$. Démontrer que f réalise une bijection de l'intervalle $I = [-1, 0]$ sur un intervalle J à déterminer. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans l'intervalle $[-1, 0]$.

4.4 Dérivabilité de la bijection réciproque

Propriété 23 (Dérivée de l'application réciproque d'une bijection)

Soit f une fonction bijective de I sur J , et soit $(x, y) \in I \times J$ tel que $y = f(x)$.

La bijection réciproque f^{-1} de f est dérivable en y si, et seulement si, f est dérivable en x et $f'(x) \neq 0$. Dans ce cas :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Si f est **dérivable** sur I et si f' **ne s'annule pas** sur I , alors f^{-1} est **dérivable** sur J .

Remarque. On peut remplacer dans la propriété ci-dessus « dérivable » par « k fois dérivable » pour tout $k \in \mathbb{N}$ ou par « indéfiniment dérivable ».

Exemple. La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \rightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & x^2 \end{cases}$ est dérivable (car polynomiale) et pour $x \in \mathbb{R}_+$, $f'(x) = 2x$. Ainsi, $f'(x) \neq 0$ si, et seulement si, $x \neq 0$. Par le théorème de dérivabilité de la fonction réciproque, la fonction racine carrée f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}_+ \setminus \{f(0)\} = \mathbb{R}_+^*$, et pour $y \in \mathbb{R}_+^*$:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$