

## Fonctions usuelles

<b>1 Logarithme, exponentielle et compagnie</b>	<b>2</b>
1.1 La fonction logarithme népérien . . . . .	2
1.2 La fonction exponentielle népérienne . . . . .	3
1.3 Racines $n$ -èmes et puissances . . . . .	4
1.4 Fonctions exponentielle et logarithme en base $a$ . .	7
1.5 Les fonctions cosinus, sinus et tangente hyperboliques	8
<b>2 Fonctions circulaires et circulaires réciproques</b>	<b>10</b>
2.1 Les fonctions circulaires . . . . .	10
2.2 Fonctions circulaires réciproques . . . . .	11

### Compétences attendues.

- ✓ Connaître les propriétés élémentaires des fonctions usuelles (dérivée, variations, limites, courbe représentative, croissances comparées).
- ✓ Maîtriser les règles de calcul liées au logarithme, à l'exponentielle et aux fonctions puissances.
- ✓ Connaître et utiliser les formules trigonométriques circulaires et hyperboliques.
- ✓ Montrer une égalité ou une identité faisant intervenir les fonctions circulaires réciproques (par application d'une fonction circulaire ou par dérivation).

# 1 Logarithme, exponentielle et compagnie

La fonction exponentielle a été introduite en classe de Première comme étant l'unique fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  satisfaisant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = f(x) \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

L'existence et l'unicité d'une telle fonction avait alors été admise, et relève de résultats qui seront vus en deuxième année. La fonction logarithme népérien en a été déduite en Terminale, comme bijection réciproque de la fonction exponentielle.

Nous proposons ici une autre construction de ces deux fonctions, en partant cette fois du logarithme. Elle se base également sur une boîte noire, le résultat suivant qui sera démontré en cours d'année.

## Théorème 1

Une fonction continue sur un intervalle  $I$  y admet des primitives.

### 1.1 La fonction logarithme népérien

#### Propriété 2

La fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  admet sur  $\mathbb{R}_+^*$  une unique primitive qui s'annule en  $x = 1$ .

On appelle *logarithme népérien* cette primitive, et on la note  $\ln$ .

Il résulte immédiatement de cette définition les points suivants :

#### Corollaire 3

- (1) La fonction  $\ln$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  et :  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad (\ln)'(x) = \frac{1}{x}$ .
- (2) La fonction  $\ln$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

#### Propriété 4

Soient  $x, y$  deux réels strictement positifs. Alors :

- (1)  $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$  ;
- (2)  $\ln\left(\frac{1}{y}\right) = -\ln(y)$  ;
- (3)  $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$  ;
- (4) Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $\ln(x^n) = n \ln(x)$ .

#### Propriété 5

La fonction  $\ln$  satisfait :


- (1)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$  ;
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$  ;
- (3)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$  ;
- (4)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ .

**Théorème 6**

La fonction  $\ln$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Définition.**

On appelle *constante de Néper* l'unique réel, noté  $e$  tel que  $\ln(e) = 1$ .



Courbe représentative de la fonction logarithme népérien.

**1.2 La fonction exponentielle népérienne****Définition.**

On appelle *fonction exponentielle népérienne*, et on note  $\exp$ , la bijection réciproque de  $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ .

De cette définition, on déduit immédiatement la :

**Propriété 7**

- (1)  $\exp(0) = 1$  et  $\exp(1) = e$ .
- (2) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $\ln \circ \exp(x) = x$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$  :  $\exp \circ \ln(x) = x$ .
- (3) La fonction  $\exp$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  : elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- (4) La fonction  $\exp$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $\exp'(x) = \exp(x)$ .


**Propriété 8**

Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ .

- (1)  $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$  ;
- (2)  $\exp(-y) = \frac{1}{\exp(y)}$  ;
- (3)  $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$  ;
- (4) pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $\exp(nx) = (\exp(x))^n$ .

**Propriété 9**

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty ; \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0 ; \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1.$$



Courbe représentative de la fonction exponentielle.

**Exercice 1.**

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$ .
2. En déduire l'encadrement suivant du nombre  $e$  pour  $n \geq 1$  :  $0 \leq e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \frac{4}{n}$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ .

**Remarque.** Pour  $n = 4000$ , on obtient  $e \approx 2.718$ .

**1.3 Racines  $n$ -èmes et puissances**

Nous avons déjà défini la fonction  $p_\alpha : x \mapsto x^\alpha$  dans les cas suivants :

- lorsque  $\alpha = n \in \mathbb{N}$  :  $p_n$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $p_n(x) = x \times x \times \dots \times x$  ( $n$  fois) ;
- lorsque  $\alpha = n \in \mathbb{Z}$ ,  $n < 0$  :  $p_n$  est définie sur les intervalles  $\mathbb{R}_+^*$  et  $\mathbb{R}_-^*$ , et pour tout  $x \neq 0$ ,  $p_n(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{-n}$ .

On souhaite étendre cette définition pour d'autres réels  $\alpha$  : on souhaiterait par exemple donner un sens à « 3 multiplié  $\frac{1}{12}$  fois par lui-même », ou encore « 2 multiplié  $\pi$  fois par lui-même ». On va donner deux manières naturelles de le faire.

### 1.3.1 Racines $n$ -èmes

#### Propriété 10

Soit  $n$  un entier supérieur à 2. La fonction  $p_n : x \mapsto x^n$  réalise une bijection de :

- $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$  si  $n$  est impair,
- $\mathbb{R}_+$  sur  $\mathbb{R}_+$  si  $n$  est pair.

On appelle *fonction racine  $n$ -ème* sa bijection réciproque, notée  $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ . Elle est définie sur  $\mathbb{R}$  si  $n$  est impair, et sur  $\mathbb{R}_+$  si  $n$  est pair.

**Remarque.** En tant que bijection réciproque de  $p_n$ , la fonction racine  $n$ -ème est continue, strictement croissante sur son ensemble de définition. Puisque  $p_n$  y est indéfiniment dérivable et que  $p'_n : x \mapsto nx^{n-1}$  s'annule si, et seulement si,  $x = 0$ ,  $p_n^{-1}$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  si  $n$  est pair, et sur  $\mathbb{R}^*$  si  $n$  est impair. Et pour tout  $x$  dans ces ensembles respectifs :

$$(p_n^{-1})'(x) = \frac{1}{p'_n(p_n^{-1}(x))} = \frac{1}{n(p_n^{-1}(x))^{n-1}} = \frac{p_n^{-1}(x)}{n(p_n^{-1}(x))^n} = \frac{1}{n} \frac{\sqrt[n]{x}}{x}.$$

De même que pour la fonction racine carrée, on vérifie que pour tous réels  $x, y$  dans le domaine de définition de la fonction racine  $n$ -ème :

$$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} \quad \text{et pour } y \neq 0 : \quad \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}.$$

Lorsque  $n$  est impair, on a toujours  $\sqrt[n]{-1} = -1$  et pour tout  $x < 0$ ,  $\sqrt[n]{x} = -\sqrt[n]{-x}$ . Attention, ces dernières formules n'ont pas de sens si  $n$  est pair !

### 1.3.2 Puissances quelconques

Une autre manière de procéder est de constater que pour tout  $x > 0$  :

$$x^n = (\exp(\ln(x)))^n = \exp(n \ln(x)).$$

Cette dernière expression ayant un sens lorsque  $n$  est réel, nous obtenons ici un moyen naturel d'étendre la définition de la fonction puissance  $p_\alpha$  à tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

#### Définition.

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . On appelle *fonction puissance d'exposant  $\alpha$*  la fonction  $p_\alpha$  définie pour tout  $x$  dans  $\mathbb{R}_+^*$  par :

$$p_\alpha(x) = \exp(\alpha \ln(x)), \quad \text{qu'on note } x^\alpha.$$



#### Danger.

La définition  $x^y = \exp(y \ln(x))$  n'est valable que pour  $x$  **strictement positif** du fait du logarithme.



#### Notation.

Pour  $x = e$  et  $y \in \mathbb{R}$ , nous obtenons :

$$e^y = \exp(y \ln(e)) = \exp(y).$$

Ceci nous autorise à noter l'exponentielle comme une puissance, ce que nous ferons à partir de maintenant.

**Exercice 2.** Soit  $x > 1$ . Simplifier l'expression  $x^{\frac{\ln(\ln(x))}{\ln(x)}}$ .

**Propriété 11** (Propriétés algébriques des puissances)

Pour tous  $x, y > 0$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{array}{lll} (1) \ln(x^\alpha) = \alpha \ln(x) ; & (3) (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta} ; & (5) \frac{1}{x^\alpha} = x^{-\alpha} = \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha . \\ (2) x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta ; & (4) (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha ; & \end{array}$$

**Remarque.** Soit  $n \in \mathbb{N}$  un entier supérieur à 2. Pour tout  $x > 0$  :

$$p_n \left( x^{\frac{1}{n}} \right) = \left( x^{\frac{1}{n}} \right)^n = x^{\frac{1}{n} \times n} = x^1 = x, \quad \text{d'où} \quad x^{\frac{1}{n}} = p_n^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}.$$

Ainsi, les fonctions  $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$  et  $x \mapsto \sqrt[n]{x}$  coïncident sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Autrement dit,  $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$  n'est autre que la restriction à  $\mathbb{R}_+^*$  de la fonction racine  $n$ -ème.

**1.3.3 Étude des fonctions puissances****Propriété 12**


Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Alors :

(1) La fonction puissance d'exposant  $\alpha$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$ , et pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$  :

$$p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{si } \alpha > 0 \\ 1 & \text{si } \alpha = 0 \\ 0 & \text{si } \alpha < 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > 0 \\ 1 & \text{si } \alpha = 0 \\ +\infty & \text{si } \alpha < 0 \end{cases}$$

(3) Si  $\alpha \neq 0$ , alors  $p_\alpha$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  sur lui-même, strictement croissante si  $\alpha > 0$ , strictement décroissante sinon. De plus,  $p_\alpha^{-1} = p_{1/\alpha}$ .



Représentation graphique de fonctions puissances.

**Remarque.** La fonction  $p_\alpha$  est a priori définie uniquement sur  $\mathbb{R}_+^*$ , mais si  $\alpha > 0$ , alors  $\lim_{x \rightarrow 0^+} p_\alpha(x) = 0$ , si bien que  $p_\alpha$  se prolonge par continuité en 0 en posant  $p_\alpha(0) = 0$ .

La question se pose alors de savoir si ce prolongement par continuité est dérivable en 0. Mais pour  $x > 0$  :

$$\frac{p_\alpha(x) - p_\alpha(0)}{x - 0} = \frac{x^\alpha}{x} = x^{\alpha-1} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > 1 \\ 1 & \text{si } \alpha = 1 \\ +\infty & \text{si } \alpha < 1 \end{cases}$$

Donc  $p_\alpha$  est dérivable en 0 si, et seulement si,  $\alpha \geq 1$ , et dans ce cas,  $p'_\alpha(0) = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > 0 \\ 1 & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$ . Pour  $\alpha < 1$ , la courbe représentative de  $p_\alpha$  admet une tangente verticale en 0.

**Propriété 13** (*Croissances comparées*)

Pour tous  $\alpha, \beta > 0$  :

<p>(1) <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^\alpha}{x^\beta} = 0</math> ;</p> <p>(2) <math>\lim_{x \rightarrow 0} x^\beta  \ln(x) ^\alpha = 0</math> ;</p>	<p>(3) <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty</math> ;</p> <p>(4) <math>\lim_{x \rightarrow -\infty}  x ^\beta e^{\alpha x} = 0</math>.</p>
---	--



**Méthode.** Comment étudier une fonction de la forme  $u(x)^{v(x)}$  ?

Si une fonction est donnée sous la forme  $u(x)^{v(x)}$  avec  $u$  à valeur strictement positive, on la réécrit systématiquement sous la forme  $\exp(v(x) \ln(u(x)))$  pour pouvoir l'étudier.

**Exercice 3.** Retrouver la limite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ .



**Mise en garde.**

On prendra garde à la « nouvelle » forme indéterminée  $1^\infty$ , qui ne l'est pas tant que ça si on la réécrit  $\exp(\infty \times \ln(1)) = \exp(\infty \times 0)$ . On pensera là aussi à l'écriture exponentielle pour tenter de lever l'indétermination.

### 1.4 Fonctions exponentielle et logarithme en base $a$

**Définition.**

Si  $a > 0$  est différent de 1, on appelle *logarithme en base  $a$*  la fonction notée  $\log_a$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par :

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

**Remarques.**

- Si  $a = e$ , la fonction  $\log_e$  n'est autre que la fonction  $\ln$ .
- Lorsque  $a = 10$ , on parle plutôt de *logarithme décimal*, qu'on note alors simplement  $\log$ . Elle satisfait  $\log(10^k) = \frac{\ln(10^k)}{\ln(10)} = \frac{k \ln(10)}{\ln(10)} = k$  pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ . Ainsi, puisque  $\log(46!) \approx 57,76$ , on en déduit que  $46!$  est un nombre à 58 chiffres.

### Le saviez-vous ?

Le logarithme est introduit en 1614 par le mathématicien John Napier, francisé en Neper. Il le définit comme étant le rapport des distances parcourues par deux mobiles, l'un avançant à vitesse constante et l'autre à une vitesse proportionnelle à la distance lui restant à parcourir.

Pour Neper, le logarithme est le rapport de deux nombres. Utilisant les racines grecques *logos* et *arithmos* qui signifient respectivement *rapport* et *nombre*, il crée le mot *logarithme*.

Le mathématicien anglais Henry Briggs se rend très vite compte de l'intérêt du logarithme pour simplifier les calculs et les définit en base 10. Se lançant dans des calculs impressionnants, il publie une table les donnant avec 14 décimales, y compris pour les fonctions trigonométriques. Ceci amènera des progrès scientifiques considérables, en particulier en astronomie.

### Propriété 14

Soit  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ . Alors :

(1) La fonction  $\log_a$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad (\log_a)'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}.$$

(2) Elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  sur  $\mathbb{R}$ , strictement croissante si  $a > 1$ , strictement décroissante sinon, et vérifie  $\log_a(1) = 0$  et  $\log_a(a) = 1$ .

(3) Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}_+^*$  et tout  $n \in \mathbb{Z}$  :

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y), \quad \log_a(x^n) = n \log_a(x).$$

### Définition.

Pour  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , on appelle *exponentielle de base a*, et on note  $\exp_a$ , la bijection réciproque de  $\log_a$ .

**Remarque.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\log_a(\exp_a(x)) = x \Leftrightarrow \ln(\exp_a(x)) = x \ln(a) \Leftrightarrow \exp_a(x) = e^{x \ln(a)} \Leftrightarrow \exp_a(x) = a^x.$$

## 1.5 Les fonctions cosinus, sinus et tangente hyperboliques

### Définition.

On appelle :

- *cosinus hyperbolique*, et on note  $\operatorname{ch}$  ou  $\operatorname{cosh}$ , la partie paire de la fonction exponentielle, définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

- *sinus hyperbolique*, et on note  $\operatorname{sh}$  ou  $\operatorname{sinh}$ , la partie impaire de la fonction exponentielle, définie sur  $\mathbb{R}$  par :


$$\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

- *tangente hyperbolique*, et on note  $\operatorname{th}$  ou  $\operatorname{tanh}$ , la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

### 📌 Le saviez-vous ?

Les fonctions hyperboliques ont été inventées par le jésuite Vincenzo Riccati dans les années 1760 alors qu'il cherchait à calculer l'aire sous l'hyperbole d'équation  $x^2 - y^2 = 1$ . La méthode géométrique qu'il employa alors était très similaire à celle que l'on peut utiliser pour calculer l'aire d'un cercle d'équation  $x^2 + y^2 = 1$ . Le calcul de l'aire du cercle fait intervenir les fonctions trigonométriques classiques que Riccati nommait cosinus et sinus circulaires. Par analogie, il appela alors les fonctions qu'il venait de créer cosinus et sinus hyperboliques. Ce fut un choix heureux, car cette ressemblance ne s'arrête pas à la méthode de calcul d'aire, mais aussi à toutes les formules trigonométriques.



### Propriété 15

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :


$$\operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x) = e^x \quad \text{et} \quad \operatorname{ch}(x)^2 - \operatorname{sh}(x)^2 = 1.$$

### Propriété 16

- (1) La fonction  $\operatorname{ch}$  est paire, indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\operatorname{ch}'(x) = \operatorname{sh}(x)$ . De plus,  $\operatorname{ch}(0) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{ch}(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{ch}(x) = +\infty$ .
- (2) La fonction  $\operatorname{sh}$  est impaire, indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\operatorname{sh}'(x) = \operatorname{ch}(x)$ . De plus,  $\operatorname{sh}(0) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sh}(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sh}(x) = -\infty$ .
- (3) La fonction  $\operatorname{th}$  est impaire, indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\operatorname{th}'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} = 1 - \operatorname{th}^2(x).$$

De plus,  $\operatorname{th}(0) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{th}(x) = -1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th}(x) = 1$ .



*Courbes représentatives des fonctions cosinus, sinus et tangente hyperboliques*

**Astuce.**

Rappelons que :

$$e^a + e^b \neq e^{a+b}.$$

Pour manipuler des quantités de la forme  $e^a \pm e^b$ , on pourra factoriser par  $e^{\frac{a+b}{2}}$ , ce qui permet alors de faire apparaître des ch ou des sh.

**Exercice 4.** Exprimer  $\frac{e^a - e^b}{1 + e^b}$  en faisant apparaître des cosinus et sinus hyperboliques.

## 2 Fonctions circulaires et circulaires réciproques

### 2.1 Les fonctions circulaires

#### Propriété 17

- (1) La fonction *cosinus* définie sur  $\mathbb{R}$  par  $x \mapsto \cos(x)$  est paire et  $2\pi$ -périodique.
- (2) La fonction *sinus* définie sur  $\mathbb{R}$  par  $x \mapsto \sin(x)$  est impaire et  $2\pi$ -périodique.
- (3) La fonction *tangente* définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  par  $x \mapsto \tan(x)$  est impaire et  $\pi$ -périodique.


#### Propriété 18

- (1) Les fonctions sinus et cosinus sont indéfiniment dérivables sur  $\mathbb{R}$ , et :

$$\sin' = \cos \quad \text{et} \quad \cos' = -\sin.$$

- (2) La fonction tangente est indéfiniment dérivable sur son ensemble de définition, et :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad (\tan)'(x) = \frac{1}{\cos(x)^2} = 1 + \tan(x)^2.$$



Courbes représentatives des fonctions sinus, cosinus et tangente.

**Remarque.** Notons que :

$$\sin'(x) = \cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

Et donc dériver sinus ou cosinus, c'est déphaser de  $\frac{\pi}{2}$ . Ceci permet aisément de calculer les dérivées successives de sin ou cos :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right).$$

**Propriété 19** (Formes indéterminées en 0)

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 ;$

(3)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} ;$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0 ;$

(4)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1.$

**Définition.**

On appelle cotangente, et on note  $\cotan$  la fonction définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$  par :

$$\cotan(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}.$$

**Mise en garde.**

On n'a pas  $\cotan = \frac{1}{\tan}$  car ces deux fonctions n'ont pas le même domaine de définition.

En revanche, il est vrai que si  $x \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z} = \{k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ , alors  $\cotan(x) = \frac{1}{\tan(x)}$ .

**2.2 Fonctions circulaires réciproques****2.2.1 La fonction arcsin****Propriété 20**

La fonction  $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$  réalise une bijection strictement croissante de  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  sur  $[-1, 1]$ .

On appelle alors *arc sinus*, et on note  $\arcsin$ , sa bijection réciproque :

$$\arcsin : \begin{cases} [-1, 1] & \longrightarrow & [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ x & \longmapsto & \arcsin(x) \end{cases}.$$

**Propriété 21**

(1) La fonction  $\arcsin$  est strictement croissante sur  $[-1, 1]$  et impaire. Elle est de plus indéfiniment dérivable sur  $] -1, 1[$ , et :

$$\forall x \in ] -1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

(2) Pour tout  $x \in [-1, 1]$ ,  $\sin(\arcsin(x)) = x$ .


(3) En revanche,  $\arcsin(\sin(x)) = x$  **uniquement si**  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .

(4) Pour tout  $(x, \theta) \in \mathbb{R}^2$  :

$$\theta = \arcsin(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \sin(\theta) = x \\ \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases}.$$

**Danger.**

On n'a pas, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\arcsin(\sin(x)) = x$  : la fonction arcsin n'est pas la bijection réciproque de sin sur  $\mathbb{R}$ , mais uniquement la bijection réciproque de sin restreinte à  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .



Courbes représentatives des fonctions sin et arcsin.

**Exercice 5.** Calculer  $\arcsin\left(\sin\left(\frac{18\pi}{7}\right)\right)$ .

### 2.2.2 La fonction arccos

#### Propriété 22

La fonction  $\cos|_{[0,\pi]}$  réalise une bijection strictement décroissante de  $[0, \pi]$  sur  $[-1, 1]$ .

On appelle alors *arc cosinus*, et on note arccos, sa bijection réciproque :

$$\arccos : \begin{cases} [-1, 1] & \longrightarrow & [0, \pi] \\ x & \longmapsto & \arccos(x) \end{cases} .$$

#### Propriété 23

(1) La fonction arccos est strictement décroissante sur  $[-1, 1]$ . Elle est de plus indéfiniment dérivable sur  $] -1, 1[$ , et :


$$\forall x \in ] -1, 1[, \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} .$$

(2) Pour tout  $x \in [-1, 1]$ ,  $\cos(\arccos(x)) = x$ .

(3) En revanche,  $\arccos(\cos(x)) = x$  **uniquement si**  $x \in [0, \pi]$ .

(4) Pour tout  $(x, \theta) \in \mathbb{R}^2$  :

$$\theta = \arccos(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\theta) = x \\ \theta \in [0, \pi] \end{cases} .$$



Courbes représentatives des fonctions cos et arccos.


**Exercice 6.** Résoudre l'équation  $\arccos(x) = \arcsin\left(\frac{12}{13}\right)$  d'inconnue  $x \in [-1, 1]$ .

**Propriété 24**

Pour tout  $x \in [-1, 1]$  :  $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$ .

**Remarque.** Cette relation a en fait une interprétation géométrique simple si  $x \in ]0, 1[$ . En effet, si l'on se place, comme dans la figure ci-contre dans un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut 1 et l'un des côtés vaut  $x$ , on a  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ . Mais  $\cos(\alpha) = \frac{x}{1} = x$ , de sorte que  $\alpha = \arccos(x)$  et de même,  $\sin(\beta) = \frac{x}{1}$ , et donc  $\beta = \arcsin(x)$ . Ainsi :

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} = \arccos(x) + \arcsin(x).$$



**2.2.3 La fonction arctan**

**Propriété 25**

La fonction tan réalise une bijection strictement croissante de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  sur  $\mathbb{R}$ .

On appelle *arc tangente*, et on note arctan, sa bijection réciproque :

$$\arctan : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \\ x & \longmapsto & \arctan(x) \end{cases} .$$



**Danger.**

Bien que  $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ , on n'a absolument pas  $\arctan = \frac{\arcsin}{\arccos}$ .

**Propriété 26**

- (1) La fonction arctan est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , impaire, avec  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$ . De plus, elle est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et :


$$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

- (2) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\tan(\arctan(x)) = x$ .

- (3) En revanche,  $\arctan(\tan(x)) = x$  **uniquement si**  $x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .

- (4) Pour tout  $(x, \theta) \in \mathbb{R}^2$  :

$$\theta = \arctan(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \tan(\theta) = x \\ \theta \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \end{cases} .$$




Courbes représentatives des fonctions tan et arctan.

**Exercice 7.** Calculer  $\theta = \arctan\left(\frac{1}{3}\right) + \arctan\left(\frac{1}{7}\right)$ .

**Propriété 27**

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}^* : \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases} .$$

**Remarque.** Cette relation a également une interprétation géométrique simple si  $x > 0$  : dans le triangle rectangle ci-contre,  $\tan(\alpha) = \frac{1}{x}$  et donc  $\alpha = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$ , et  $\tan(\beta) = x$  de sorte que  $\beta = \arctan(x)$ . On conclut en notant que  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ .



## Formules sur les dérivées

Fonction	Domaine de dérivabilité	Dérivée
$\ln(x)$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$e^x$ ( $x \in \mathbb{R}$ )	$\mathbb{R}$	$e^x$
$x^\alpha$ , $\alpha \in \mathbb{R}$	$]0, +\infty[$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sqrt{x}$ ( $x \in [0, +\infty[$ )	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$	$1 + \tan(x)^2 = \frac{1}{\cos(x)^2}$
$\arccos(x)$	$] -1, 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arcsin(x)$	$] -1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\text{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\text{sh}(x)$
$\text{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\text{sh}(x)$
$\text{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$1 - \text{th}(x)^2 = \frac{1}{\text{ch}(x)^2}$